

75/89/1  
Název: Detmol-cap  
ŠTÁT

## Detmol - cap

Detmol-cap je vodou ředitelná mikroenkapsulovaná suspenze určená k aplikaci postřikem, s několikaměsíční účinností na švába obecného, rusa domácího a různé druhy brouků, k aplikaci ve formě bariér proti škodlivým druhům hmyzu, ve vnitřních prostorách budov.

### Účinná látka:

mikroenkapsulovaný cyphenothrin 10%

### Pozor:

R-věty: ---

S-2: Uchovávejte mimo dosah dětí !

S-13: Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv !

S-36/37: Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice !

S-42: Při fumigaci nebo rozprašování používejte ochrannou masku s filtrem A1-P3 !

### Návod k použití:

Detmol-cap je mikroenkapsulovaný přípravek. Je-li aplikován na porézní povrch, jeho účinná látka se nevsakuje. Mikrokapsule zůstávají na povrchu, ulpívají na těle hmyzu a na ošetřeném povrchu zůstávají účinné po dlouhou dobu.

Detmop-cap se pro použití ředí na 1% pracovní jíchu, t.j. do menšího množství vody se přidá 50 ml přípravku, dobře se rozmíchý a doplní se vodou do 5-ti litrů. Obsah postřikovače s naředěnou jíchou je nutné každých 15 minut důkladně protřepat, aby se zabránilo usazování. Nejvhodnější tlak v postřikovači je 2 bary.

U balení s dávkovacím zařízením to představuje 2 odměrky po 25 ml. Dávkuje se tak, že se uvolní červený uzávěr, láhev se opatrně stlačuje, až se dávkovací nádobka zaplní po okraj. Přebytek steče zpět do láhve.

Při prvném zásahu v objektech zamořených rusem domácím nebo švábem obecným a pro dlouhodobější účinnost lze použít 2% pracovní jíchu (t.j. 100 ml přípravku na 5 litrů vody). Postřik se aplikuje na všechna místa, kde se škodlivý hmyz ve dne a v noci může vyskytovat. Základní dávkování postřiku je 50 ml na plošný metr, na porézních površích se spotřeba postřikové látky může zvýšit až na 100 ml na plošný metr. Ze svislých ploch nesmí postřik stekat.

### Švábi a rusi:

Rus domácí: Aplikaci přípravku je nutné opakovat v plném rozsahu po 5-ti týdnech.

Šváb obecný: Aplikaci je nutné opakovat v plném rozsahu po 5-ti měsících.

### Bezpečnostní opatření:

Při práci s přípravkem se používá ochranný oděv Unita či Lesan, ochranný obličejoový štit ŠP-15 nebo D-1 s čepcem a gumové rukavice, případně dostupné schválené ekvivalenty. Při aplikaci přípravku se smí v místnosti zdržovat pouze osoby, které

provádějí dezinfekci. Všechny nedostatečně zabalené potraviny, krmiva, hračky, používané nádobí a také domácí zvířata je nutné odstranit z místnosti ještě před vlastní aplikací přípravku. Všechny stoly, pracovní desky a plochy, na kterých se ukládají nebo zpracovávají potraviny nebo které přicházejí do styku s pokožkou, je třeba dostatečně příkryt a po aplikaci přípravku důkladně omýt alkaliským čisticím prostředkem. Nestříkat na koberce a textilní podlahové krytiny. Je nutné zabránit přímému kontaktu s čerstvě nastříkaným a nedostatečně zaschlým povrchem. Nestříkat na nechráněné elektrické vodiče, přístroje a vypínače. Až do důkladného zaschnutí naneseného přípravku dobře větrat. Při práci dodržujte zákaz jídla, pití a kouření. Před jídlem a po skončení práce se důkladně omyjte teplou vodou s mýdlem. Zbytky postřikové kapaliny a oplachové vody se nesmí vylévat v blízkosti zdrojů vod a recipientů povrchových vod.

**První pomoc:**

V případě požití vypít 1/2 litru vlažné vody, případně s 10 tabletami medicinálního uhlí a drážděním hrdla vyvolat zvracení. Postiženého dopravit k lékaři.

**Při zasažení oka:**

Vyplachovat proudem čisté vody po dobu nejméně 15 minut a vyhledat lékaře, zejména pokud přetríváva podráždění.

**Při podráždění pokožky:**

Odstranit potřísněný oděv, zasažená místa umýt teplou vodou s mýdlem.

**Při nadýchání:**

Přerušit práci, odejít na čerstvý vzduch, zajistit klidovou polohu a chránit před chladem.

V případě požití a ve všech případech otravy nebo podezření na otravu neprodleně vyhledat lékařskou pomoc. Lékaře informovat o přípravku se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci.

V případě potřeby lze teratii konzultovat s toxikologickým informačním střediskem: Vyšehradská 49, 128 21 Praha 2, tel.: 02-24919293.

**Skladování:**

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech, v suchých uzamykatelných skladech, odděleně od potravin a krmiv. Chraňte před mrazem.

**Likvidace obalů:**

Prázdné obaly se po důkladném vypláchnutí a znehodnocení mohou předat do sběru k recyklaci nebo se spálí ve schválené spalovně.

**Balení:**

Dávkovací láhev z umělé hmoty o obsahu 500 ml  
Plastikový obal o obsahu 5 l

**Výrobce:** Frowein GmbH, SRN

**Pro ČR registruje výhradní dodavatel:**

de Wolf 3xD, s.r.o., Mánesova 26, 350 02 Cheb